



RAT NOIR, RAT DES GRENIERS, RAT DES NAVIRES

Rattus rattus

MAMMIFÈRE : Rodentia

- CARACTÉRISTIQUES -

(les mots en italiques ont leur définition dans le glossaire)



TAILLE

ADULTE : corps d'environ 20 cm avec queue légèrement supérieure au corps. Masse d'environ 200 g.



DESCRIPTION

De couleur noire. Excellent grimpeur, plus arboricole que son cousin le surmulot. Capable de circuler sur des câbles électriques ou fils à linge. Il fréquente essentiellement les greniers et combles pour ne pas être confronté aux surmulots. Crottes oblongues légèrement courbées d'environ 20 mm. *Traces de suint* sur les supports empruntés par les rats. Vue faible, ouïe et odorat bien développés. Nid composé de brindilles, papier, textiles... souvent situé en hauteur. Nocturne. Animal vivant en société avec hiérarchie marquée.



CYCLE BIOLOGIQUE

Gestation de 21 jours. Portée de 5 à 9 petits. Maturité sexuelle atteinte entre 12 et 15 semaines. En milieu urbain capable de se reproduire toute l'année. Espérance de vie : environ 1 an.



RÉGIME ALIMENTAIRE

Alimentation surtout d'origine végétale mais capable de consommer des *arthropodes* et petits vertébrés.



HABITAT & MODE DE VIE

Espèce souvent arboricole, pouvant être terrestre si absence totale de surmulot. Evite les zones humides (nage peu). Territoire plus restreint que le surmulot. Activité diurne possible mais souvent signe d'une forte infestation.



NUISANCES

Dégradation de nombreuses denrées, peu sont consommées mais souillées par excréments et urine. Bruits de rongements. Transmission possible de bactéries, virus et parasites. Cas d'allergie. Présence anxio-gène pour certaines personnes. Odeur de cadavre (mort naturelle ou possible suite à dératisation).



TRAITEMENT

Utilisation de *rodenticides* à disposer sur le territoire des rats noirs (essentiellement combles & greniers). Travailler sur les accès : végétation sur façade, branches d'arbres touchant la toiture, *crapaudine* absente, câbles électriques ou téléphoniques sur façade... Éliminer toutes sources d'eau. Interventions régulières à prévoir dans les sites sensibles ou infestés de façon récurrente.



ANECDOTE !

Le rat noir ou rat des navires fut le rat responsable des épidémies de peste au Moyen-Âge. Considéré comme un « réservoir » à bactéries, c'est par la puce du rat que la peste était transmise aux hommes.